

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

補中益気湯^④

(ほちゅうえつきとう)

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。：むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人。：高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしただけで息切れがする・息苦しくなる。空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋力痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

元気がなく、胃腸の働きがおとろえて疲れやすいものの次の諸症：虚弱体質、疲労倦怠、病後の衰弱、食欲不振、あせ。

【用法・用量】

大人(15才以上)は1包(1日量)につき水400mLを加え、あまり強くない火にかけ200mLに煮つめ、紙袋とともにかすを取り去り、食前1時間前又は食間空腹時に温服して下さい。小人(15才未満2才以上)は同様に煎じて食間空腹時に服用して下さい。

年齢	1包(1日量)煎じ液	1日服用回数
大人(15才以上)	全量	3~2回に分けて
15才未満7才以上	2/3量	3回に分けて
7才未満4才以上	1/2量	
4才未満2才以上	1/3量	
2才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。


【成分・分量】[本品1包(1日量)21.0g中]

日本薬局方ニンジン	4.0g	日本薬局方サイコ	1.0g
日本薬局方ビャクジュツ	4.0g	日本薬局方カンゾウ	1.0g
日本薬局方オウギ	3.0g	日本薬局方ショウキョウ	0.5g
日本薬局方トウキ	3.0g	日本薬局方ショウマ	0.5g
日本薬局方タイソウ	2.0g	日本薬局方チンピ	2.0g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気のない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
- (4) 煎じ薬は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。



【製造販売元】  東洋漢方製薬株式会社
〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号

【問い合わせ先】本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。
東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」
電話 0120-00-1040
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先(独)医薬品医療機器総合機構 電話 0120-149-931

【発売元】



株式会社 **タキザワ漢方**
ホームページ: takizawa.asia **タキザワ漢方**